

INTERESANTE CAPTURA DEL PICAFLOR COLUDO

En Villa María, Córdoba, fué capturado el 16 de agosto de 1952 un ejemplar hembra del picaflor *Sappho sparganura sappho* (Lesson), que pasó a las colecciones del Museo Argentino de Ciencias Naturales de Buenos Aires con el número 52-542.

Este troquilido, típicamente serrano, se distribuye geográficamente por el oeste argentino desde Salta hasta Neuquén. Para la llanura no ha sido citado aún en forma categórica, pues Serié y Smyth (Hornero, 3 : 45, 1923) lo señalan sin confirmar para Santa Elena (Entre Ríos) y Zotta (Lista Sist. Av. Arg., p. 92, 1944), luego de dar su distribución geográfica normal, agrega « ocasionalmente en Buenos Aires ». Para esta provincia la única cita documentada es la de Pereyra (Av. zona riber. NE prov. Bs. Aires, p. 167, 1938).

Con el ejemplar mencionado, obtenido por uno de nosotros (F. H.), podemos basar una cita para la planicie ya que Villa María se halla a unos cien kilómetros al este de las sierras cordobesas donde el Picaflor coludo es frecuente. —
JUAN D. DELUS y FRANCA HAMMERSCHMIDT, *Buenos Aires, noviembre de 1952.*